

PRÁCTICO 7: TEORÍA DE GRUPOS - CONCEPTOS BÁSICOS.

Ejercicio 1. En cada uno de los siguientes casos, investigar si el conjunto y la operación forman un grupo.

a. El conjunto $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ con el producto usual de matrices: $A * B = AB$.

b. El conjunto $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ con la operación: $A * B = AB + BA$.

c. El conjunto \mathbb{R}^2 con la operación: $(x_1, x_2) * (y_1, y_2) = (x_1 y_1, x_2 y_1 + y_2)$.

d. $G = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & a & c \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} : a, b, c \in \mathbb{Z} \right\}$ con el producto usual de matrices.

e. El conjunto $\{a, b, c\}$, con la operación $*$ definida mediante la tabla:

| | | | |
|---|---|---|---|
| * | a | b | c |
| a | a | b | c |
| b | b | c | a |
| c | c | a | b |

f. El conjunto $\{a, b, c, d\}$, con la operación $*$ definida mediante la tabla:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| * | a | b | c | d |
| a | a | b | c | d |
| b | b | c | a | a |
| c | c | a | b | b |
| d | d | a | b | c |

g. El conjunto \mathbb{Z} con la operación \otimes definida por: $a \otimes b = ab - 2(a + b) + 6$.

Ejercicio 2. Completar la tabla de Cayley de cada grupo (G, \cdot) .

a. $G = \{e, a, b, c, d\}$ con tabla de Cayley parcial:

| | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|
| \cdot | e | a | b | c | d |
| e | e | a | b | c | d |
| a | a | | | | |
| b | b | | | | c |
| c | c | d | | | e |
| d | d | | | | |

b. $G = \{e, a, b, c, d, f\}$ con tabla de Cayley parcial:

| | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| \cdot | e | a | b | c | d | f |
| e | e | a | b | c | d | f |
| a | a | | e | | | |
| b | b | | | f | | d |
| c | c | | | | b | a |
| d | d | | | | | b |
| f | f | | | b | | |

Ejercicio 3. Sea (G, \cdot) un grupo con neutro e . Probar las siguientes afirmaciones:

a. $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$, $\forall a, b \in G$.

d. Si $(ab)^3 = e$ entonces $(ba)^3 = e$.

b. $(a^n)^{-1} = (a^{-1})^n$, $\forall a \in G, n \in \mathbb{N}$.


e. Si $xg = xh$ o $gx = hx$, para algún $x \in G$, entonces $g = h$.

c. Si $gh = e$ o $hg = e$, entonces $h = g^{-1}$.

Subgrupos

Ejercicio 4. Para cada uno de los grupos G , investigar si H es un subgrupo de G :

- $G = (\mathbb{Z}, +)$ y $H = n\mathbb{Z}$ el conjunto de los enteros múltiplos de n (para $n \in \mathbb{Z}$ dado).
- $G = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ con el producto y $H = \mathbb{R}^+$ el conjunto de los reales positivos.
- $G = GL_2(\mathbb{R})$ (matrices invertibles 2×2 con coeficientes reales) con el producto usual de matrices y $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) : ac \neq 0 \right\}$.
- $G = GL_2(\mathbb{R})$ y $H = \{M \in G : \det(M) = 1\}$.
- $G = \mathbb{Q}^+$ con el producto y $H = \left\{ \frac{a}{b} \in \mathbb{Q} : a \equiv 0 \pmod{7}, \text{mcd}(b, 7) = 1 \right\}$.
- $G = D_3 = \{\text{id}, r, r^2, s, sr, sr^2\}$, el grupo dihedral de un triángulo equilátero, y $H = \{\text{id}, r, r^2, s, s\}$.



- $G = S_3$ el grupo de permutaciones de 3 elementos, y $H = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \right\}$.

Ejercicio 5. Sean H_1 y H_2 dos subgrupos de un grupo G .

- Probar que $H_1 \cap H_2$ es un subgrupo de G .
- Sean $H_1 = 2\mathbb{Z}$ y $H_2 = 3\mathbb{Z}$, dos subgrupos de $G = \mathbb{Z}$. Probar que $H_1 \cup H_2$ no es un subgrupo de \mathbb{Z} . Este ejemplo muestra que la unión de subgrupos no siempre es un subgrupo.
- Probar que si $H_1 \cup H_2$ es un subgrupo de G , entonces $H_1 \subseteq H_2$ o $H_2 \subseteq H_1$.

Grupos conmutativos (abelianos)

Ejercicio 6. Sea (G, \cdot) un grupo con neutro e . Probar las siguientes afirmaciones:

- $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}, \forall a, b \in G \Leftrightarrow G$ es abeliano.
- $(ab)^2 = a^2b^2, \forall a, b \in G \Leftrightarrow G$ es abeliano.

Ejercicio 7. Sea G un grupo abeliano. Probar que H es un subgrupo de G para los siguientes casos:

- $H = \{a \in G : a^2 = e_G\}$.
- $H = \{a^n : a \in G\}$ con n un entero positivo dado.

Ejercicio 8. Sea G un grupo con neutro e . Supongamos que existen elementos $a, b \in G$, tales que: $a \neq e$, $b \neq e$, $a^7 = e$, $b^3 = e$ y $ab = ba^2$. Probar que:

- G no es conmutativo.
- $(ab)^2 = b^2a^6$.
- $(ab)^3 = e$.